Respiración

Fluvial

( )

Respiración Fluvial es una instalación sonora en la que experimentar la respiración de los ríos Segre y Ebro en forma de una polifonía compuesta por los ciclos vitales de las diversas especies que participan del pulso del río.



Las protagonistas de la instalación son un coro de náyades, o almejas de río , que están en peligro de extinción en en Catalunya y Aragón por la amenaza de las continuas modificaciones a su hábitat , la llegada de varias especies invasoras y los niveles de contaminación de los ríos.

Este coro encarna y da voz a los acuíferos, como antaño lo hacían las Náyades mitológicas, ninfas de fuentes y ríos en la antigua Grecia.

NÁYADES :

1. Habitantes de la turbidez.
2. De las fuentes: creneas **(Κρηναιαι)** o crénides **(Κρηνιες)**
3. De los pantanos: heleades (Ἑλειονομοι)
4. De los lagos: limnades **(Λιμναδες)** o limnátides **(Λιμνητιδες, Λιμνατιδες)**
5. De los manantiales: pegeas **(Πηγαιαι)**
6. De los ríos: potámides **(Ποταμηιδες)**

Las castañuelas de corazón , se tocan como un mudra, a diferencia de las pulgareteras, desbloquean las muñecas y conecta el ritmo con todo el cuerpo.

( )

Con cuerpo de sifón, el tiempo discurre como lágrima de carbonato cálcico, calcita, aragonita, estalactitas de mejilla, mango de navaja, peineta. Habitantes de la turbidez que cantan en nácar.

La medida necesaria más urgente para conservar a M. auricularia es garantizar la supervivencia de la población del Canal Imperial de Aragón frente a las agresiones que está sufriendo ese ecosistema por los actuales planes de modernización (GÓMEZ Y ARAUJO, 2008), para lo que sería necesario incluir la especie en el Anexo II de la Directiva Hábitats y posteriormente protejer el Canal bajo una ley apropiada que asegure la conservación tanto del patrimonio natural (la especie y su hábitat) como del cultural y artístico (la obra civil).

Range values of these factors during a complete year indicate that the habitat of M. auricularia is basic, well oxygenated, subsaline, beta-alpha meso-saprobic and oligo-hyperthophic water. Temperature in the Imperial Canal ranged between 7.4 (March) and 22.9 °C (August) (Araujo & Ramos, 2000a). The habitat requirements for M. auricularia were for Temperature (15,2°), pH (8), dissolved oxygen (9.6 mg/l), conductivity (438S/cm), total phosphorous (0,07 mg/L), nitrates (12,5 mg/L), nitrite (0,04 mg/L), orthophosphate (o,1 mg/L), ,calcium (64 mg/L), organic carbon (3,4 mg/L), and the sediment structure in more than 70% was sandy-gravellish or gravellish, with moderate flow.

Una turbidez metabolizable: Typically, bioremediation is based on the cometabolism action of one organism or a consortium ... of

[hs] homesession.org
LA PANERA
eTOPIA_
Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura